

Te
¿Chequeaste?

PREVENCIÓN

La prevención más eficaz es la vacunación contra el VPH. Recomendada para niñas y jóvenes mujeres, aunque también puede ser beneficiosa en otros grupos de edad.

El tamizaje regular mediante pruebas de Papanicolaou o pruebas de VPH. También es fundamental para la detección temprana de lesiones precancerosas.

Escucha tu cuerpo



¿Tienes tus exámenes al día?

Es importante que te realices una vez al año tus exámenes preventivos



¿Sabes por qué es importante?

Realizarse chequeos médicos regulares y exámenes oportunos te ayudan a detectar enfermedades



¿Sabes qué son los factores protectores?

- Tener una alimentación equilibrada
- Realizar actividad física regular
- Evitar el consumo excesivo de alcohol
- No fumar



CONTACTO

Whatsapp +56 9 4299 5415
Mail Contacto@vi-da.cl
Instagram fundacionvida
Página Web www.vi-da.cl

Estamos
para
Ti

PATROCINA
AstraZeneca

vi-da
FUNDACIÓN



FACTORES DE RIESGO



Infección por VPH
(Virus del papiloma humano)



Iniciación temprana de
la actividad sexual



Múltiples parejas
sexuales



Tabaquismo



Inmunosupresión

ITS

Infecciones de transmisión
sexual



El cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello uterino, es un tumor maligno que se origina en las células del cuello del útero. La causa principal es la infección persistente por ciertas cepas oncogénicas del virus del papiloma humano (VPH)

*Esta enfermedad es el tercer tipo más frecuente en incidencia.

***SEXTO**
EN MORTALIDAD.



Importante

DIAGNÓSTICO



La detección suele iniciarse con pruebas de tamizaje como el Papanicolaou o pruebas de VPH.

Si se detectan células anormales, se procede a realizar una **colposcopia** y **biopsia** para confirmar el diagnóstico.

Otras pruebas de imagen como la **resonancia magnética** o la **tomografía computarizada** pueden usarse para evaluar la extensión de la enfermedad.

TRATAMIENTO



El tratamiento depende del **ESTADÍO DEL CÁNCER** y puede incluir cirugía, radioterapia y quimioterapia.

En **estadios tempranos**, las opciones quirúrgicas pueden ser suficientes.

Mientras que los casos más avanzados suelen requerir un **enfoque multimodal**.



***1503 nuevos casos**
el año 2020 en CHILE.

*<https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=->

*Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Defunciones y Mortalidad por causas – DEIS [Internet]. [cited 2015 Dec 23]. Available from: <http://www.deis.cl/?p=2541>

*https://www.supersalud.gob.cl/difusion/665/articulos-18739_archivo_fuente.pdf